非 RI を利用した EMSA の有効性

上野和美, 松川 茂 (福井医科大学 実験実習機器センター)

Kazumi Ueno, Shigeru Matsukawa

Non RI EMSA detection of ER•ERE complex formation using fluorescence labeled Response Element DNA

EMSA (electrophoretic mobility shift assay) is an indispensable tool for investigating the binding ability or fashion of receptor proteins belonging to nuclear superfamily to their corresponding response element DNA sequences. As this assay, which generally employs radio-labeled DNA as a probe for response element, can not be allowed to be performed in the conventional labs, we developed the EMSA method using the fluorescence labeled probe DNA, for which such experiment can be performed without taking any special cares such as disintegration (short life) and contamination of radio-isotope, or irradiation of beta-ray during handling of labeled DNA probe. We also examined the effect of methylation of cytosine residues existing in the probe DNA on estrogen receptor binding to (by EMSA), thermal stability of (by measurement of T_m) and conformation (by comparison of CD spectra) of the target DNA sequence.

はじめに

細胞の分化, 成長, 活性化は, 特異的な遺伝子発現によって正確に制御されており, 転写レベルの遺伝子発現の調節は, 特に重要な役割を担っていると考えられている。様々な内因性又は外因性シグナルの刺激に応答して遺伝子が発現されるが, 応答性遺伝子のの上流には様々な形をした応答 DNA 配列, 即ち Response Element が存在する。転写因子の多くは, DNA のこのような Response Element に異なった様式で結合することが次第に明らかになってきた。この相互作用の様式や転写因子相互の複雑な関係を解析する方法の1つとしてゲルシフトアッセイが有力な手段となっている。

女性ホルモン Estrogen receptor (ER) とその応答配列との結合をモデル系として, ゲルシフトアッセイの非 RI 法を検討した。

ゲルシフトアッセイ

ゲルシフトアッセイは 細胞から調製した蛋白抽出液を RI ラベルしたプローブ DNA 断片 (ERE) に結合させ, 非変性ポリアクリルアミド電気泳動を行うと形成された DNA 蛋白複合体の移動度が Free の DNA 断片より小さくなることをオートラジオグラフィで確認する方法である。また, DNA 蛋白複合体に特異的抗体を添加した場合, その移動度はさらに小さくなり, スーパーシフトする (図 1. ここでは recombinant ER α の EMSA を示す。) 普通の実験室で RI の半減期を気にせず簡単にこのような実験ができれば便利なので, RI を使用せず蛍光ラベルされたプローブ DNA を用いてゲルシフトアッセイを行い, そのラベル法及び検出方法を検討したので報告する。

図 1 .RI (P³²) ラベル ERE を使用した Gel Shift Assay

検討項目

目的として 1) Estrogen Receptor 結合塩基配列を含む 2 本の単鎖オリゴ DNA を蛍光でラベルし 2 本鎖を作製する (ERE)。2) 蛍光ラベル ERE と ER α または ER β の結合をゲルシフトアッセイする。また, ER に対する特異的抗体によるスーパーシフトも検出する。3) DNA シーケンサー又は Fluor Imager でバンドシフトを検出するための条件を検討する。4) DNA のメチル化が ER の結合に及ぼす影響を検討する。

(両 3' 末端は, 蛍光ラベル化のために陥没型にしてある。)

ラベル法

1. Label IT

最初に宝酒造から販売されている Label IT[®]を用いたラベル法を検討した。まず, ER α , ER β が認識する塩基を含む 2 本の単鎖オリゴを混合し, 2 本鎖としてから, Label IT により 37 °C で 1 時間でラベルし, ゲル濾過精製により DNA プローブ を得た。また, 同様に

蛍光ラベル用PCR反応条件

100μM ER-U	1.0μl	
100μM ER-L	1.0μl	
25mM MgCl ₂	1.2μl	
5mM dATP	0.8μl	
5mM dCTP	0.8μl	
5mM dGTP	0.8μl	
2mM dTTP	0.8μl	
1mM *dUTP	1.0μl	
× 5 Reaction Buffer	4.0μl	
× 8 Thermo Sequenase	1.0μl	
H ₂ O	7.6μl	
Total	20.0μl	

UpperとLower単鎖もラベルし精製を行った。次に、ラベルUpperと非ラベルLower、ラベルUpperとラベルLower、ラベルLowerと非ラベルUpperを等量比で混ぜ2本鎖にした。これらのラベルしたEREとERαのゲルシフトアッセイの結果(図2)、ERE・ERαの複合体は > > > の順に薄くなっている。後で述べる酵素法でラベルされたEREに比べると結合効率の著しい低下を認めた。この方法は、ss, dsに関わらずGを特異的に蛍光ラベルするものであり、UpperはLowerよりGが多く、単鎖オリゴをラベルしてから2本鎖にしても、2本鎖にしてからラベルしてもERの結合部分にラベルが入るのでERの結合が阻害されゲルシフトが検出できなくなるものと考えられる。

図2 .Label IT EREを使用した結果

2-1. DNAシーケンサーによる検出

Texas-Red EREを用いてGel Shift Assayを行う場合は、日立製のDNAシーケンサーを検出器として使用するが、そのままでは検出できなかったため次の様な改良を加えた。1) スペースの厚みを0.9mmに変更、2) 短い特製ガラス板(10cm)を使用、3) 外部電源を使用、4) +, - 極泳動槽内のbufferの循環を行う。この改良されたシーケンサーを用い先の条件で実験を行った結果(図3)である。この方法では、検出に時間がかかる(Super Shiftで60min)のために、スーパーシフトのシャープなバンドの検出が難しくなった。

Gel Shift Assay 条件

反応組成

Gel Shift Assay
 0.48pmol 蛍光ラベルERE
 2.6pmol Estrogen Receptor
 0.6μg poly(dl-dC)
 3μg BSA
 100mM KCl
 20mM Tris(pH7.5)
 20% glycerol

反応条件

Estrogen Receptor
 +
 antibody ER
 室温 10min incubate
 ↓
 その他を加え氷上で
 1hrインキュベート

Super Shift Assay

+ 1μg anti ER 抗体

Total 10μl

泳動条件

4% low-ionic-strength polyacrylamide gel(80:1)
 low-ionic-strength electrophoresis buffer pH8.0

100V, 3hr, 15 泳動結果

図3 .日立DNASequencerによる Estrogen Receptor (α) Gel Shift Assay 結果

2-2. Fluor Imager による検出

次にミニゲルを使用し Fluorescein でラベルされたEREを用いてゲルシフトを行いFluor Imager (Molecular Dynamics) で検出した結果を示す(図4)。100V, 40minの泳動で検出でき、ミニゲルで扱いやすく簡便である。蛍光ラベルしたEREは、RIとは異なった構造になるために、蛋白の認識部位ではなく、蛍光構造部分に蛋白が結合している可能性があり、次の実験を行なった。

図4 .ミニゲルを使用したGel Shift Assay (Fluor Imagerによる)

図9 .EREのメチル化の影響

図10 .メチル化EREの Melting Curve の比較

図11 .メチル化EREのCDの比較

1-2. メチル化 ERE の Melting Curve の比較

ライトサイクラーを使用して図8で示した3つのメチル化EREのMelting Curveを比較したところ(図10), cont (77) < (78) < (79) < (80) とメチル化Cの数が増えるほどTm値は上昇するのでdouble strandの安定化にメチル化が影響すると思われる。

1-3. メチル化 ERE の円偏光二色性 (CD) の比較

円偏光二色性は、物質に特有の物性であり、その分子の絶対構造に依存してスペクトルを示す。そこで、両鎖のメチル化が立体構造にどのように影響するかをCDによって比較した。はds, は一部ssの測定CD, はupper, lowerの1本鎖のCDを算術加算平均である。スペクトルは両者でよく似ているがメチル化EREはノーマルなEREに比べて-CD(245nm), +CD(281nm)とも値が低くなっている。また, dsであるがssであると異なっていることから、使用したEREが2本鎖構造をとっていることが判明した。

まとめ

以上より次のような結果を得た。1) 蛍光ラベル化方法は、Thermo Sequenase®(Amersham)を使用した酵素法が検討した中でも最適だった。2) 蛍光自動DNA sequencerをTexas Red標識EREを用いたGel Shift Assayに使用するには、克服すべきいくつかの困難がある。3) 蛍光ラベルDNAを用いたGel Shift Assayは、RIラベルに比べ安全かつ簡便であるが検討する課題も残っている(蛍光色素の結合の影響、部位特異ラベル化など)。4) メチル化の量が多くなるほどEREとの結合力は弱くなり、double strandの結合力は逆に強くなる。

蛍光ラベル法としては、この他に(1)オリゴ合成時に5'末端に導入する方法,(2)オリゴDNAの5'末端に酵素(kinase)導入する方法,(3)オリゴDNAの3'末端にTdT(ターミナルトランスフェラーゼ)により導入する方法がある。(1)の変法としてEREコンセンサス配列の一方の鎖に15塩基長位を延長して合成し、その部位に相補的な蛍光標識オリゴを合成し、アニールする方法がある。この方法では延長部のオリゴ配列を一旦決めておくといつも同じ蛍光標識オリゴを用いればよいので、便利かつ経済的である。しかも、応答配列部への標識蛍光のかさ高さの影響も抑えられる可能性がある。

以上、高感度を維持しつつ、普通の実験室で行えるというメリットを生かし、様々な特異DNA結合性タンパクの相互作用様式の解明にも役立てうるのではないかと考える。